

Common questions answered and other important information about the COVID-19 vaccine.

1. Do I need to wear a mask after I am vaccinated?

Yes! Keep masking and distancing!

2. Am I immune as soon as I'm vaccinated? Can I still get COVID-19?

After you're vaccinated with both doses, you should develop immunity in about one to two weeks. Therefore, it is possible to be infected with COVID-19 just before or just after vaccination and then get sick because the vaccine did not have enough time to provide protection.

3. Can I get COVID-19 from the vaccine?

Nope! There is no live virus in the COVID-19 vaccine.

4. Isn't one dose enough?

No. For the vaccines currently available, two doses are required for the vaccine to work best. Get the second dose when scheduled, even if you had mild side effects after the first one, unless your health care provider advises you not to get the second shot.

5. The COVID-19 vaccines were developed quickly. Are they unsafe?

No safety steps were skipped when developing the COVID-19 vaccines. The real-world evidence also shows that they are very safe!

6. Can the vaccine track me?

No. There is no tracking technology in the vaccine.

7. Does the vaccine change my DNA?

Nope! It teaches your cells how to recognize the virus and fight it, but it doesn't impact the part of our cells where DNA is found.

8. Can the vaccine make me sterile?

Nope, it can't make anyone sterile.

9. If I'm allergic to egg can I get the COVID-19 vaccine?

Yes, you can take the COVID-19 vaccines currently available.

10. Can the vaccine give me HIV?

Nope. However, having HIV means you are at a higher risk for complications from COVID-19, and being vaccinated can reduce that risk.

COMMON SIDE EFFECTS

The COVID-19 vaccine helps protect you from COVID-19 illness. You may experience mild side effects after receiving it. This is normal and indicates the vaccine is helping your body build immunity against COVID-19.

- Chills
- Diarrhea
- Fatigue
- Fever
- Headache
- Muscle and/or joint pain
- Redness, swelling and/or pain at the injection site
- Vomiting

Cough, shortness of breath, new loss of taste or smell, sore throat, congestion or runny nose are not expected symptoms of the vaccine. Testing for COVID-19 is recommended even if these symptoms arise within 48 hours of vaccination.

Common questions answered and other important information about the COVID-19 vaccine.

- 1. Do I need to wear a mask after I am vaccinated?**
Yes! Keep masking and distancing!
- 2. Am I immune as soon as I'm vaccinated? Can I still get COVID-19?**
After you're vaccinated with both doses, you should develop immunity in about one to two weeks. Therefore, it is possible to be infected with COVID-19 just before or just after vaccination and then get sick because the vaccine did not have enough time to provide protection.
- 3. Can I get COVID-19 from the vaccine?**
Nope! There is no live virus in the COVID-19 vaccine.
- 4. Isn't one dose enough?**
No. For the vaccines currently available, two doses are required for the vaccine to work best. Get the second dose when scheduled, even if you had mild side effects after the first one, unless your health care provider advises you not to get the second shot.
- 5. The COVID-19 vaccines were developed quickly. Are they unsafe?**
No safety steps were skipped when developing the COVID-19 vaccines. The real-world evidence also shows that they are very safe!
- 6. Can the vaccine track me?**
No. There is no tracking technology in the vaccine.
- 7. Does the vaccine change my DNA?**
Nope! It teaches your cells how to recognize the virus and fight it, but it doesn't impact the part of our cells where DNA is found.
- 8. Can the vaccine make me sterile?**
Nope, it can't make anyone sterile.
- 9. If I'm allergic to egg can I get the COVID-19 vaccine?**
Yes, you can take the COVID-19 vaccines currently available.
- 10. Can the vaccine give me HIV?**
Nope. However, having HIV means you are at a higher risk for complications from COVID-19, and being vaccinated can reduce that risk.

Derribando mitos sobre la vacuna contra el COVID-19

Preguntas y respuestas ante mitos comunes sobre la vacuna contra el COVID-19.

1. ¿Necesito usar máscara después de vacunarme?

¡Sí! ¡Sigue con tu máscara y manteniendo la distancia!

2. ¿Soy inmune tan pronto reciba la vacuna? ¿Puede aún darme COVID-19?

Después de recibir ambas dosis, desarrollarás inmunidad en una o dos semanas aproximadamente. Por lo tanto, es posible contraer COVID-19 justo antes o después de la vacunación y aun luego porque la vacuna no ha tenido suficiente tiempo para proveer protección.

3. ¿Puedo contraer COVID-19 por vacunarme?

¡No! No hay virus vivo en la vacuna contra el COVID-19.

4. ¿No es una dosis suficiente?

No. Con las vacunas disponibles actualmente, se requieren dos dosis para que sea efectiva. Obtenga la segunda dosis cuando esté programada, incluso si tuvo efectos secundarios leves después de la primera, excepto si su proveedor médico le aconseja que no se ponga la segunda inyección.

5. Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron rápidamente. ¿Son inseguras?

No se omitieron medidas de seguridad al desarrollar las vacunas contra el COVID-19. ¡La evidencia muestra que son muy seguras!

6. ¿Puede la vacuna rastrearne?

No. No hay tecnología de rastreo en la vacuna.

7. ¿La vacuna cambiará mi ADN?

¡No! Enseñará a sus células a reconocer el virus y combatirlo, pero no afectará la parte de nuestras células donde reside el ADN.

8. ¿Puede la vacuna volverme estéril?

No, no puede volver estéril a nadie.

9. Si soy alérgico al huevo ¿puedo recibir la vacuna contra el COVID-19?

Sí, puede recibir la vacuna contra el COVID-19 actualmente disponibles.

10. ¿Puede la vacuna darme VIH?

No. Sin embargo, tener VIH implica que usted tiene mayor riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19, y ser vacunado puede reducir ese riesgo.

EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTES

La vacuna contra el COVID-19 ayuda a protegerle de la enfermedad. Usted puede experimentar efectos secundarios después de recibirla. Esto es normal e indica que la vacuna está creando inmunidad contra el COVID-19.

- Escalofríos
- Diarrea
- Fatiga
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular y/o articular
- Enrojecimiento, hinchazón y/o dolor en el lugar de la inyección
- Vómitos

Tos, falta de aliento, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o nariz con moqueo no son síntomas esperados de la vacuna. La Prueba para COVID-19 es recomendada incluso si estos síntomas surgen entre las primeras 48 horas de vacunación.

Derribando mitos sobre la vacuna contra el COVID-19

Preguntas y respuestas ante mitos comunes sobre la vacuna contra el COVID-19.

1. ¿Necesito usar máscara después de vacunarme?

¡Sí! ¡Sigue con tu máscara y manteniendo la distancia!

2. ¿Soy inmune tan pronto reciba la vacuna? ¿Puede aún darme COVID-19?

Después de recibir ambas dosis, desarrollarás inmunidad en una o dos semanas aproximadamente. Por lo tanto, es posible contraer COVID-19 justo antes o después de la vacunación y aun luego porque la vacuna no ha tenido suficiente tiempo para proveer protección.

3. ¿Puedo contraer COVID-19 por vacunarme?

¡No! No hay virus vivo en la vacuna contra el COVID-19.

4. ¿No es una dosis suficiente?

No. Con las vacunas disponibles actualmente, se requieren dos dosis para que sea efectiva. Obtenga la segunda dosis cuando esté programada, incluso si tuvo efectos secundarios leves después de la primera, excepto si su proveedor médico le aconseja que no se ponga la segunda inyección.

5. Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron rápidamente. ¿Son inseguras?

No se omitieron medidas de seguridad al desarrollar las vacunas contra el COVID-19. ¡La evidencia muestra que son muy seguras!

6. ¿Puede la vacuna rastrearne?

No. No hay tecnología de rastreo en la vacuna.

7. ¿La vacuna cambiará mi ADN?

¡No! Enseñará a sus células a reconocer el virus y combatirlo, pero no afectará la parte de nuestras células donde reside el ADN.

8. ¿Puede la vacuna volverme estéril?

No, no puede volver estéril a nadie.

9. Si soy alérgico al huevo ¿puedo recibir la vacuna contra el COVID-19?

Sí, puede recibir la vacuna contra el COVID-19 actualmente disponibles.

10. ¿Puede la vacuna darme VIH?

No. Sin embargo, tener VIH implica que usted tiene mayor riesgo de sufrir complicaciones por COVID-19, y ser vacunado puede reducir ese riesgo.